

# Dophexine® 20mg/g

[Grįžti į produktų sąrašą](#)



Registracijos žymuo

**LT/2/20/2613/001-005**

## Paskirties gyvūnų rūšys:



## Sudėtis

Kiekviename grame miltelių yra:

**veikliosios medžiagos:**

bromheksino 18,2 mg,

kaip bromheksino hidrochlorido 20,0 mg;

## Išlauka

Kiaulėms: skerdienai ir subproduktams – 0 parų.

Vištoms, kalakutams, antims: skerdenai ir subproduktams 0 parų.

Galvijams (veršeliams): skerdienai ir subproduktams – 2 paros.

Neskirtas naudoti paukščiams, dedantiems žmonių maistui skirtus kiaušinius, kiaušinių dėjimo metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

## Indikacijos

Užsikimšusių kvėpavimo takų mukolitinis gydymas.

## Kita informacija

---

- Pakuotė

1 kg dėžutė arba 5kg kibirėlis

---

- Vaisto forma

Milteliai naudoti su geriamuoju vandeniu ar pienu

---

- Naudojimo būdas ir dozės

Naudoti per burną su geriamuoju vandeniu arba pieno pakaitalu.

0,45 mg bromheksino 1 kg kūno svorio dieną, tai atitinka 2,5 g vaisto 100 kg kūno svorio per dieną, naudojant 3-10 dienų iš eilės.

---

- Kontraindikacijos

Negalima naudoti esant plaučių edemai.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų

---

- Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinoma.

---

- Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 3 mėn.

Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus geriamuoju vandeniu, – 24 valandos geriamajame vandenyje.

Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus pienu (pakaitalu), – 6 valandos

---

- Rinkodaros teisės turėtojas

Dopharma Research B.V.

## Specialieji įspėjimai:

### Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Esant sunkiai plaučių kirmėlių infekcijai, vaistas turėtų būti naudojamas tik praėjus 3 dienoms nuo

antihelmintinio gydymo pradžios.

**Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams**

Šis vaistas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bromheksinui arba laktozei, turi vengti sąlyčio su šiuo vaistu.

**Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu**

Tyrimais su laboratoriniais gyvūnais fetotoksinis poveikis ar poveikis vaisingumui, naudojant rekomenduojamą dozę, nenustatytas. Tačiau tyrimas nebuvo atliktas su konkrečiomis tikslinėmis rūšimis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

**Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos**

Šį vaistą galima naudoti kartu su antibiotikais ir (arba) sulfonamidais bei bronchus plečiančiais vaistais. Bromheksinas keičia antibiotikų pasiskirstymą organizme ir padidina jų koncentraciją serume ir nosies sekrete (pvz., spiramicino, tilozino ir oksitetraciklino). Vis dėlto naudojant kartu su šiuo vaistu, negalima skirti per mažos antimikrobinių vaistų dozės.

**Nesuderinamumai**

Kadangi nėra atlikta suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

[Kontaktai](#)