

Doxylin® 100 %


[Grįžti į produktų sąrašą](#)



Registracijos žymuo

LT/2/13/2203/001

Paskirties gyvūnų rūšys:



Sudėtis

1 g miltelių yra:
veikliosios medžiagos:
doksiciklino hidrato 1000 mg (atitinka 867 mg doksiciklino).

Išlauka

Veršienai ir subproduktams – 14 parų,
Kiaulienai ir subproduktams – 8 paros.

Indikacijos

Veršeliams:

- *Pasteurella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Histophilus somni* ir *Mycoplasma spp.* sukelta bronchopneumonija ir pleuropneumonija.

Kiaulėms:

- *Pasteurella multocida* ir *Bordetella bronchiseptica* sukeltas atrofinis rinitas,
- *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis* ir *Mycoplasma hyorhinis* sukelta bronchopneumonija,
- *Actinobacillus pleuropneumoniae* sukelta pleuropneumonija.

Kita informacija

- Pakuotė

1 kg talpyklė.

- Vaisto forma

Geriamieji milteliai.

- Naudojimo būdas ir dozės

Naudojimo būdas:

veršeliams: girdyti ištirpinus piene (pieno pakaitale),

kiaulėms: girdyti ištirpinus geriamajame vandenyje.

Dozavimas:

veršeliams: 10 mg doksiciklino hiklato 1 kg kūno svorio per parą, 3-5 dienas iš eilės, sugirdant per 2 kartus.

kiaulėms: 10 mg doksiciklino hiklato 1 kg kūno svorio per parą, 3-5 dienas iš eilės.

Tikslus vaisto, skiriamo su geriamuoju vandeniu, paros kiekis turėtų būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į rekomenduojamą dozę ir gydytinių gyvūnų skaičių bei svorį pagal šią formulę:

... mg vaisto 1 kg kūno svorio per parą x Gydytinių gyvūnų vidutinis kūno svoris (kg)

Vidutinis vieno gyvūno per parą išgeriamo vandens kiekis (l)

= ... mg miltelių / 1 l geriamojo vandens

Siekiant užtikrinti tinkamą dozavimą, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

Išgeriamo su vaistu sumaišyto vandens kiekis priklauso nuo gyvūnų klinikinės būklės. Siekiant suduoti tinkamą dozę, gali reikėti koreguoti jo koncentraciją geriamajame vandenyje. Jei naudojamos nepilnos pakuotės, rekomenduojama naudoti tinkamai sukalibruotą svėrimo įrangą.

Vaisto paros dozę reikia įmaišyti į tokį geriamojo vandens kiekį, kad visas vaistas būtų suvartotas per 24 val.

Geriamasis vanduo su vaistu turėtų būti šviežiai paruošiamas kas 12 val. Rekomenduojama paruošti koncentruotą tirpalo ruošinį (maks. 400 g vaisto 10 litrų geriamojo vandens) ir prireikus jį toliau skiesti iki gydymosi koncentracijos. Taip pat koncentruotą tirpalą galima naudoti proporciniu vandens prisotinimo vaistais įrenginiu.

Vaisto tirpumas priklauso nuo pH. Vietovėse, kuriose vanduo labai šarminis, geriamajame vandenyje gali susidaryti nuosėdos. Vaisto negalima naudoti labai kietame vandenyje esant daugiau kaip 16° d ir didesniame kaip 8 pH.

Pieno pakaitalą su vaistu reikia sunaudoti per 6 val. Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį, kad neperdozuoti.

- Kontraindikacijos

Negalima naudoti gyvūnams, esant aktyviam mikrobiologiniam virškinimui didžiajame prieskrandyje.

Negalima naudoti padidėjus jautrumui tetraciklinams.

Neskirti gyvūnams, sergantiems sunkiu kepenų ir inkstų nepakankamumu.

- Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas):

Po vienos ar kelių dozių veršeliams gali pasireikšti ūmi, kartais mirtina miokardo degeneracija.

Kadangi dažniausiai taip atsitinka dėl perdozavimo, svarbu tiksliai išmatuoti dozę.

Retais atvejais tetraciklinai gali sukelti padidėjusio jautrumo šviesai ir alergines reakcijas. Įtarus, kad pasireiškė nepalanki reakcija, gydymą reikia nutraukti.

- **Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas**

Talpyklę laikyti sandariai uždarytą, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės – 3 metai.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 3 mėn.

Tinkamumo laikas, ištirpinus geriamajame vandenyje, – 12 val.

Tinkamumo laikas, ištirpinus pieno pakaitale, – 6 val.

- **Rinkodaros teisės turėtojas:**

Dopharma Research B.V.

Specialieji išpėjimai:

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Sunkiai sergančių gyvūnų gėrimo įpročiai yra pasikeitę, todėl juos reikia gydyti parenteriniu būdu.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Pieną su vaistais būtina skirti kiekvienam veršeliui atskirai. Taip pat reikia atsižvelgti į doksiciklino atsiskyrimą pieno pakaitaluose. Kad to būtų išvengta, išpilstant pieną, maišytuvą reikia palikti įjungtą.

Dėl tikėtino bakterijų jautrumo doksiciklinui kintamumo (dėl laiko, geografinių sąlygų) labai rekomenduojama paimti sergančių fermos gyvūnų bakteriologinį mėginį ir atlikti mikroorganizmų jautrumo tyrimą.

Jeigu tai neįmanoma, gydymas turi būti pagrįstas vietine (regiono ir fermos) epidemiologine informacija apie tikslinių bakterijų jautrumą, taip pat būtina atsižvelgti į oficialią nacionalinę antibakterinių vaistų naudojimo politiką.

Vaistą naudojant netinkamai, gali išplisti doksiciklinui atsparios bakterijos ir sumažėti gydymo kitais tetraciklinais veiksmingumas dėl galimo kryžminio atsparumo.

Negalima girdyti iš oksiduotų girdymo įrenginių. Kai kuriose ES šalyse gauta pranešimų apie kiaulių kvėpavimo takų ligų Sukėlėjų (*A. pleuropneumoniae*, *S. suis*) ir veršelių ligų sukėlėjų (*Pasteurella* spp.) atsparumą tetraciklinams.

Kadangi tikslinių patogenų gali nepavykti išnaikinti, gydymą vaistais reikia derinti su gero valdymo praktika, t. y. laikytis higienos reikalavimų, užtikrinti tinkamą vėdinimą ir vengti gyvūnų pertekliaus jų laikymo vietoje.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Jeigu žinoma apie alergiją tetraciklino klasės antibiotikams, reikia būti atsargiam naudojant šį vaistą ar tirpalą su vaistu.

Siekiant išvengti jautrinimo ir kontaktinio dermatito, ruošiant ir skiriant geriamąjį vandenį su vaistu, reikia vengti odos ir akių kontakto su vaistu ir stengtis neįkvėpti dulkių dalelių. Dirbant su vaistu, mūvėti nepralaidžias pirštines (pvz., gumines ar lateksines) ir dėvėti tinkamą kaukę nuo dulkių (pvz., vienkartinį pusę veido dengiantį respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN 149).

Patekus į akis ar ant odos, pažeistą vietą nuplauti dideliu kiekiu švaraus vandens ir, jeigu atsiranda sudirgimas, kreiptis į gydytoją. Panaudojus vaistą, nedelsiant nusiplauti rankas ir užterštą odą.

Jei po sąlyčio su vaistu pasireiškia tokie simptomai kaip odos išbėrimas, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šį išpėjimą.

Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni požymiai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

Naudojant vaistą, negalima rūkyti, valgyti ar gerti.

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Dėl doksiciklino kaupimosi jauname kauliniame audinyje reikia riboti šio vaisto naudojimą vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenaudoti kartu su baktericidiniais antibiotikais, pvz., penicilinais ir cefalosporinais.

Esant dideliame kalcio, geležies, magnio ar aliuminio kiekiui pašare, gali sumažėti doksiciklino absorbcija. Nenaudoti kartu su skrandžio rūgštingumą mažinančiais preparatais, kaoliniu ir geležies preparatais. Patariama, kad intervalas tarp kitų vaistų, kurių sudėtyje yra polivalentinių katijonų, skyrimo būtų 1–2 valandos, nes jie riboja tetraciklinų absorbciją.

Rekomenduojama, kad intervalas tarp kitų vaistų, kurių sudėtyje yra polivalentinių katijonų, skyrimo būtų 1–2 valandos, kadangi jie sumažina tetraciklinų absorbciją.

Doksiciklinas sustiprina antikoagulantų veikimą.

Vaisto tirpumas priklauso nuo pH. Maišant šarminiame tirpale, susidarys nuosėdų.

Geriamojo vandens nelaikyti metalinėse talpyklose.

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarinį specialistą. Ar jūs esate veterinarinio gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

[Kontaktai](#)