

OXY L.A.

[Grįžti į produktų sąrašą](#)



Registracijos žymuo

LT/2/02/1465/001

Paskirties gyvūnų rūšys:



Sudėtis

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

oksitetraciklino (dihidrato) 200 mg.

Išlauka

Galvijienai, kiaulienai, ožkienai ir subproduktams – 14 parų,
Pienui – 7 paros.

Indikacijos

Galvijams

Ūmine kvėpavimo takų infekcine liga sergantiems galvijams naudotinas kartu su atitinkamu gydymu antibiotikais klinikiškai simptomams mažinti.

Viduriuojantiems vyresniems nei savaitės amžiaus veršeliams ir jauniems, nemelžiamiems galvijams skiriamas kartu su peroraliniu rehidraciniu gydymu klinikiškai simptomams mažinti.

Sergant ūminiu mastitu, rekomenduotinas kaip papildantis gydymą antibiotikais vaistas.

Veršeliams pooperaciniam skausmui, pašalinus ragus, malšinti.

Kiaulėms

Esant neinfekciniams lokomotoriniams sutrikimams, raišumo ir uždegimo simptomams mažinti.

Esant septicemijai ir toksemijai (mastito, metrito ir agalaktijos sindromui) po atsivedimo, naudotinas kaip papildantis gydymą antibiotikais vaistas.

Kita informacija

- Pakuotė

100 ml buteliukas.

- Vaisto forma

Injekcinis tirpalas.

- Naudojimo būdas ir dozės

Galvijams, kiaulėms ir ožkoms gydyti, sergant infekcinėmis ligomis, sukeltomis oksitetraciklinui jautrių gramneigiamų ir gramteigiamų mikroorganizmų:

galvijų ir ožkų pneumonija ir transportavimo karštine, sukelta *Pasteurella multocida* ir *Manheimia haemolytica*, nagų puvinis ir difterija, sukelta *Fusobacterium necrophorum*, *E. coli* sukeltu enteritu, aktinobacilioze, sukelta *Actinobacillus lignieresii*, leptospiroze, sukelta *Leptospira* spp., anaplazmoze, sukelta *Anaplasma marginale*,

kiaulių – *E. coli* sukeltu enteritu, pneumonija, sukelta *Pasteurella multocida* ir *Actinobacillus pleuropneumoniae*, leptospiroze, sukelta *Leptospira pomona*, profilaktiškai nuo atrofino rinito, sukelta *Bordetella bronchiseptica* ir *Pasteurella multocida*.

- Kontraindikacijos

Negalima naudoti gyvuliams sutrikus inkstų funkcijoms ir su kitais nefrotoksiškai veikiančiais vaistais.

- Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas):

Retai jautriems gyvuliams gali pasireikšti alergija ar anafilaksinė reakcija. Tokiu atveju vaisto naudoti nebegalima ir būtina sušvirkšti epinefrino, antihistamininių medžiagų ir (ar) kortikosteroidų.

Naudojant oksitetracikliną gali paspartėti jam nejautrių mikroorganizmų augimas, todėl pasireiškus superinfekcijai šio vaisto naudoti negalima ir reikia taikyti specifinės terapijos priemones.

- Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

- Rinkodaros teisės turėtojas:

Dopharma Research B.V.

Specialieji išpėjimai:

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nėra.

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nerekomenduotina naudoti su penicilinais ir kitais baktericidiniais vaistais. Vienu metu negalima naudoti injekcinių geležies preparatų, nes gyvulį gali ištikti šokas. Galima naudoti su furazolidonu, bacitracino cinko druska, sulfonamidais.

Oksitetraciklinas su oleandomicinu veikia sinergiškai atsparius stafilokokus, su nistatinu – mikroskopinių grybų sukeltas ligas, su streptomycinu efektyviai veikia bruceliozės sukėlėjus.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarinį specialistą. Ar jūs esate veterinarinio gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

[Kontaktai](#)